

## Коклюш

### Что такое Pertussis?

Pertussis - это бактериальная инфекция носа и горла, которая очень быстро распространяется. Эта болезнь , также, известна под названием коклюш .

### Кто может заразиться коклюшем?

В большинстве случаев, болезни подвержены дети в возрасте менее пяти лет, но любой человек может заразиться этой болезнью. Число заболеваний этой болезнью среди детей старшего возраста, а также, среди взрослых увеличивается, особенно, среди тех кто вакцинирован не полностью.

Тот человек, у которого заболевание протекает в легкой форме, может заразить детей в возрасте до одного года или детей младшего возраста, особенно тех, кто вакцинирован не полностью. Эта категория детей , наиболее подвержена тяжелым формам протекания болезни, а также, осложнениям, такими как: пневмония, затруднённое дыхание, припадки или может привести к летальному исходу.

Люди, имеющие вакцинацию, могут заболеть Коклюшем, но, обычно, заболевание протекает в облегчённой форме.

**Любой человек(особенно, это относится к детям грудного возраста и детям младшего возраста), кто не имеет вакцинации, находится под большим риском протекания этого заболевания в тяжёлой фоме.**

### Как происходит распространение болезни?

- Болезнь распространяется воздушно- капельным путем, через рот и нос инфицированного человека
- Нахождение в близком контакте с инфицированным человеком может привести к заражению

### Как скоро проявляются симптомы коклюша после заражения?

Симптомы появляются на 4 – 10 день после заражения и могут продолжаться в течение 21 дня.

### Симптомы коклюша

Pertussis ,обычно, начинается с недомогания, похожего на простуду или грипп:

- насморк
- кашель средней тяжести
- слезящиеся глаза
- чихание
- небольшая температура

После 1-2 недель кашель усиливается. Pertussis может стать причиной конвульсивного, приступообразного кашля с последующим характерным ,свистящим звуком при выдыхании воздуха . Иногда, особенно у детей младшего возраста приступы кашля заканчиваются рвотой. У взрослых и детей старшего возраста , которые были вакцинированы полностью, болезнь протекает в легкой форме

### Как предупредить Pertussis?

- Лучший способ предупреждения -это иммунизация.
  - Вакцинация, предупреждающая возникновение Pertussis, проводится детям в возрасте 2, 4, 6, & 15 месяцев, а также в возрасте 4-6 лет.
  - Школьники, поступающие в 7 класс, обязаны получить ревакцинацию, называемую Tdap для увеличения защиты против Коклюша.
  - Детям старшего возраста и взрослым следует получить вакцину Tdap ,особенно, если они имеют контакт с детьми в возрасте до одного года.
  - Всем женщинам, находящимся в третьем триместре беременности, следует сделать вакцинацию Tdap для защиты новорожденных от болезни.
- Закрывайте нос и рот при чихании и кашле
- Часто мойте руки водой с мылом.

12/2014

**По поводу дополнительной информации обратитесь:**

Отделение по контролю за заболеваниями ~ 828.250.5109

Адрес: 40 Coxe Ave, Asheville(центр города), NC 28801



[buncombecounty.org/hhs](http://buncombecounty.org/hhs)